



side 2/2		Koordinater for startpunkt		
Stednavn	Inventør	Dato	30 m-felt - X	30 m-felt - Y

Angiv botaniske fund med kode for dækningsgrad, for arter fundet i 30 m-felt:

+: Få individer - < 2%                      2 : 2-25%                      4 : 50-75%  
 1: Mange individer - < 2%                      3 : 25-50%                      5 : 75-100%

OBS: Arter fundet uden for 30 m-felt i de efterfølgende 70 m noteres med en o (cirkel)

agermåne, almindelig (K)	hvene, almindelig (S)	pimpinelle, almindelig (*)	star, spidskapslet ()
ahorn ()	hvene, kryb- ()	Pleurozium schreberi (S)	star, vår- (**)
bakketidsel (K*)	hvene, sand- (S*)	potentil, krybende (K)	stenbræk, kornet (*)
blæresmælde (K)	hvidtjørn, almindelig (*)	potentil, mat (K**)	stenurt, bidende (K*)
blåbær (S*)	hvidtjørn, éngriflet ()	potentil, sølv- ()	storkenæb, blodrød (K**)
blåhat (*)	Hypnum cupressiforme (S*)	rajgræs, almindelig (#)	storkenæb, blød (#)
blåmunke (S*)	høgeurt, håret (*)	randfrø, hvas (K)	svingel, bakke- (*)
blåtop (S)	høgeurt, smalbladet (S*)	ranunkel, bidende ()	svingel, eng- ()
borst, høst- ()	hønsetarm, almindelig ()	ranunkel, knold- (*)	svingel, fåre- (S*)
brandbæger, eng- ()	hønsetarm, femhannet (*)	ranunkel, lav (#)	svingel, rød ()
brunelle, almindelig (*)	hør, vild (K*)	rapgræs coll., eng- ()	svingel, strand- (K)
bunke, bølget (S)	jordbær, bakke- (K*)	rapgræs, almindelig (#)	syre, almindelig ()
bunke, mose- (S)	kalkkarse, stivhåret (K*)	rapgræs, eng- ()	syre, dusk- ()
bynke, grå- (K#)	kamgræs, almindelig (*)	rapgræs, enårig (#)	tandbælg (S**)
bynke, mark- ()	katteskæg (S*)	rapgræs, fladstrået (K)	tidsel, ager- (#)
Camptothecium lutescen(K*)	kløkke, liden (*)	rejnfan (K#)	tidsel, horse- (K#)
coll., brombær ()	kløver, bugtet (*)	Rhytidiadelphus squarro (S)	tidsel, kær- (S*)
Dicranum scoparium (S*)	kløver, fin ()	rose, blågrøn ()	tidsel, lav (K**)
djævelsbid (S**)	kløver, gul ()	rose, glat hunde- (K)	timian, bredbladet (K**)
draphavre (K#)	kløver, hare- ()	rottehale, eng- ()	timian, smalbladet (**)
dværgbunke, tidlig (S*)	kløver, hvid- (#)	rottehale, glat (K**)	tjærenelike (*)
dværgbunke, udspærret (*)	kløver, rød- ()	rottehale, knold- (K*)	tormentil (S**)
eg, almindelig (S)	knopurt, almindelig (K*)	rundbælg (*)	torskemund, almindelig ()
ene (S*)	knopurt, stor (K*)	rødknæ (S)	tusindfryd (#)
engelskgræs, strand- (*)	kodriver, hulkravet (K*)	røllike, almindelig ()	vejbred, dunet (K*)
engelskgræs, vej- ()	kongepen, almindelig (S)	rørhvene, bjerg- (S)	vejbred, glat (#)
enghavre, almindelig (**)	krageklo, mark- (K*)	Scleropodium purum ()	vejbred, lancet- ()
enghavre, dunet (K*)	kvik, almindelig (#)	siv, knop- (S)	vikke, muse- (*)
fladbælg, gul ()	kællingetand, almindelig (*)	siv, lyse- (S)	vikke, smalbladet ()
fladbælg, krat- (S*)	kørvel, vild (K#)	skabiose, due- (K**)	vikke, tofrøet (#)
fladstjerne, græsbladet (*)	limurt, nikkende (K*)	skjaller, liden (*)	viol, hunde- (S**)
flipkrave (S*)	løg, sand- (K*)	skræppe, kruset (#)	viol, håret (K*)
fløjlgræs ()	løg, vild (K*)	slåen ()	visse, engelsk (S*)
frytle, mangleblomstret (S*)	markarve (K)	sneglebælg, humle- (K)	voldtimian (K*)
frytle, mark- (*)	merian (K**)	snerle, ager- (K)	ærenpris, læge- (S*)
gederams (S#)	mjørdurt, knoldet (K**)	snerre, burre- (K#)	ærenpris, mark- ()
gulaks, vellugtende (*)	mælkebøtte, fandens (#)	snerre, gul (*)	ærenpris, tveskægget ()
gulerod (K)	mælkebøtteslægten ()	snerre, hvid ()	
gyldenris, almindelig (S*)	mælkeurt, almindelig (**)	snerre, lyng- (S*)	
gyvel (S#)	nellike, bakke- (*)	star, almindelig (S*)	
gåsepotentil ()	nellikerod, feber- (K)	star, blågrøn (*)	
hedelyng (S*)	nælde, stor (#)	star, hare- (S*)	
hejre, blød ()	okseøje, hvid (K)	star, hirse- (S*)	
hestegræs, krybende (S)	padderok, ager- ()	star, håret ()	
hindbær (S#)	perikon, kantet ()	star, pigget (*)	
hjertergræs (**)	perikon, prikbladet ()	star, pille- (S*)	
hundegræs, almindelig ()	pil, krybende (S*)	star, sand- (S*)	